



Jardín

AZUFRE ANTI-OIDIO ECO 50 GR

- Fungicida-acaricida autorizado en agricultura ecológica.
- Contra oídio y araña roja en todo tipo de plantas: arbustos ornamentales; frutales, hortícolas, vid y olivos.
- **Preventivo y curativo.**

Pulverización foliar manual con mochila (granulado a a disolver).

Dosificación: 2 - 5 g/L de agua. Contiene cuchara dosificadora (= 1 g).

Hasta 25 L.

Intervalo entre aplicaciones: 7 – 10 días.

Plazo de seguridad: no procede.



Producto utilizable en Agricultura Ecológica según el Reglamento (UE) 2018/848 y 2021/1165 y según el Reglamento NOP. Control ECOCERT SA F-32600

COMPOSICIÓN:

Nº de inscripción: 24.136 80% Azufre

DATOS LOGÍSTICOS

Descripción:	AZUFRE ANTI-OIDIO ECO 50 GR		
Cod. Producto:	231811	Envase:	50 gr
Código EAN:	8424084023069	Unidad Caja:	12
Código DUN:	18424084023066	Uds/ Palet:	600 (50 cajas)
-		-	

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ



Viladomat 321 - 08029 Barcelona



(34) 934 952 500



massoconsumo@cqmasso.com

www.massosconsumo.com

Modo de empleo:

Aplicación al aire libre mediante pulverización manual con mochila. Es recomendable comenzar las aplicaciones preventivamente o a la aparición de los síntomas de la enfermedad.

Preparación del caldo: verter la cantidad necesaria de producto en el equipo de pulverización manual llenándolo hasta la mitad y completar con el volumen de agua necesario.

Usos y dosis autorizados:

CULTIVO (al aire libre)	PLAGAS Y ENFERMEDADES	DOSIS	VOL. CALDO (L/SUPERFICIE)	NÚMERO DE APLICACIONES	INTERVALO ENTRE APLICACIONES	CONDIC. ESPECÍFICO
Arbustos ornamentales	Oídio	2-4 g/L (0,3-0,4 g/m ²)	0,5-1 L/10m ²	Máx. 5	7 - 10 días	Aplicar en cualquier estado de desarrollo de la planta.
	Araña Roja					
	Ácaros					
Beretiana, melón, pimiento, sandía, tomate	Araña Roja	2 g/L (0,08-0,2 g/m ²)	0,4-1 L/10m ²	Máx. 6	Min. 10 días	Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad.
	Oídio					
	Oidiopsis					
Fresal, rosal	Oídio	2-4 g/L (0,3-0,4 g/m ²)	0,5-1 L/10m ²	Máx. 6	7 - 10 días	
Frutales de hueso (melocotón, nectarina, cerezo y ciruelo)	Araña Roja	2-5 g/L (0,14-0,5 g/m ²)	0,7-1 L/10m ²	Máx. 6	7 - 10 días	
	Eriofidos					
	Oídio					
Frutales de pepita (manzana, pera, níspero y membrillo)	Araña Roja	2-5 g/L (0,14-0,5 g/m ²)	0,7-1 L/10m ²	Máx. 6	7 - 10 días	
	Eriofidos					
	Oídio					
Limonero	Ácaro de las maravillas	2-5 g/L (0,3-0,5 g/m ²)	1,5-2 L/10m ²	Máx. 6	Min. 10 días	
Olivo	Negrilla	2-4 g/L (0,35-0,4 g/m ²)	0,8-1 L/10m ²	1		Aplicar en primavera, desde que los brotes alcancen el 10% de su tamaño final hasta la apertura de las primeras flores (BBCH 31-40).
Vid	Araña Roja	2-4 g/L (0,3-0,4 g/m ²)	0,5-1 L/10m ²	Máx. 8	7 - 10 días	Aplicar desde que haya 5-8 hojas desplegadas (desde BBCH 15-18).
	Erinosis					
	Oídio					

Plagas diana:

Oídio



Araña roja



Negrilla



Ácaros

