



FICHA TÉCNICA

RATICIDA BLOQUES BRODIFACOUM



INTRODUCCIÓN

RATICIDA BLOQUES es un **cebo en bloques** listo para el uso a base de *brodifacoum*, con actividad contra cualquier tipo de roedor de cualquier especie y tamaño (ratas, ratones) y **especialmente contra topos**. Es activo frente a roedores resistentes a otros anticoagulantes.

La muerte del roedor se produce algunos días después de la ingestión, a causa de hemorragias internas, sin agonía y, en general, lejos del lugar de consumo o bien en el fondo de sus madrigueras, por lo que no despiertan la desconfianza de sus congéneres.

COMPOSICIÓN

Brodifacoum, 0.0029%

PRESENTACIÓN

Bloque parafínico de color azul

Se presenta en:

Bolsa 250 g, 250 g x 2, y 3 kg..
Cada bloque pesa 20 g aprox.

PRINCIPALES APLICACIONES

Debido a sus especiales características, el cebo **RATICIDA BLOQUES**, formulado en pequeños bloques, **mantiene su estabilidad y eficacia frente a condiciones de elevada humedad** e incluso en contacto con el agua. Por ello se concibe como un **producto ideal** en situaciones en las que debe exponerse el cebo a la **intemperie**, como en el **control de topos, topillos y ratillas**.



Rata-Topo o Rata de agua



Topillo común



Ratilla



Los daños que ocasionan estos roedores son principalmente los numerosos agujeros (bocas de galerías) y montículos de tierra (toperas) que provocan al excavar las galerías. También roen las raíces y el cuello de plantas, árboles y arbustos, sobre todo jóvenes, pudiendo ocasionarles la muerte.

MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION

Para el **control de topos** se recomienda comenzar con la destrucción de todos los montones de tierra, efectuando la aplicación del producto al cabo de unos días, cuando aparecen nuevos montones, indicativo de las galerías que están activas. Se colocarán como mínimo **20-40 gramos (2-4 bloques)** de **RATICIDA BLOQUES** en el interior de las galerías, sin cerrarlas posteriormente, con el fin de atraerlos hacia la zona donde se depositó el producto.

Para el **control de ratones** se recomienda colocar al menos **20 gramos (1 bloque)** de **FLOWER BLOQUES** por punto de cebo, y para el **control de ratas** se recomienda colocar al menos 60 gramos (3 bloques) de FLOWER BLOQUES por punto de cebo.. En caso de colocar muchos puntos, se recomienda anotar donde se colocaron para facilitar la revisión de los mismos disminuyendo o aumentando los puntos de cebo, según el consumo observado. Las cantidades medias aconsejables dependen del grado de infestación.

No tocar los bloques-cebo con las manos desnudas.

Para su seguridad, utilice guantes (se incluyen en la caja).

Además evitará que el animal detecte el olor humano y desconfíe.

Proteja los cebos escondiéndolos detrás de tejas invertidas u otros artilugios, a fin de evitar el acceso de los niños y animales domésticos.

Se tomarán todas las medidas necesarias para evitar que el producto contamine los utensilios, los alimentos y sus envases.

OBSERVACIONES



*El **topo común**, que también puede ocasionar daños en campos, prados o jardines, y que está dotado de unas extremidades anteriores transformadas en pala para poder excavar, se alimenta de insectos y otros invertebrados, por lo que para su control se deberá emplear un cebo apropiado a sus apetencias y no un bloque parafínico, pues este animal no es un roedor.*

RATICIDA BLOQUES se trata de un **PLAGUICIDA de USO DOMÉSTICO**, por lo que A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO que aparecen en la etiqueta del producto.