



FICHA TÉCNICA

# BRODICUM PASTA FRESCA

60294

Nº Registro: ES/BB (MR)-2019-14-00619



## INTRODUCCIÓN

**BRODICUM PASTA FRESCA** es un rodenticida de acción anticoagulante y de “Uso por el público en general”. La muerte ocurre por hemorragia interna en unos días, sin dolor. Por su efecto retardado desde la ingesta, los roedores suelen morir en sus nidos. Contiene cereales y otros alimentos que atraen fuertemente a los roedores. Contiene también una sustancia de sabor amargo que, al conferirle sabor desagradable, evita la ingestión por parte del ser humano y animales domésticos. Es eficaz frente a poblaciones resistentes a anticoagulantes de primera generación.



Debido a las características del cebo, puede utilizarse tanto para desratizaciones genéricas como específicas (lugares húmedos, viviendas, depósitos, almacenes, etc...). Es activo contra roedores resistentes a la Warfarina.

**AUTORIZADO TAMBIEN PARA USO DOMÉSTICO – Jardinería Exterior/Interior**  
**Doméstica Nº registro BIOCIDA ES/BB(MR)-2019-14-00619**

## COMPOSICIÓN

*Brodifacoum, 0,0025% p/p (CAS 56073-10-0)*

## PRESENTACIÓN

Cebo pasta fresca color azul

**Se presenta en:**  
Bolsa 150g (15uds x 10g)

## PRINCIPALES APLICACIONES

Rodenticida general para el control de ratas, ratones y demás roedores. Recomendado para el control de la rata gris (*Rattus norvegicus*), la rata negra (*Rattus rattus*), y el ratón doméstico (*Mus musculus*) principalmente. De uso doméstico y ambiental.



*Rattus rattus*



*Rattus norvegicus*

**DOSIS Y MODO DE EMPLEO**

- Retirar la comida fácilmente disponible para los roedores (ej: grano suelto o residuos de alimentos). Aparte de esto, no limpiar la zona a tratar justo antes del tratamiento, esto solo molestará a los roedores y la aceptación del cebo será más difícil de alcanzar.
- Aplicar en porta cebos, que los usuarios deberán etiquetar con la siguiente información: “no mover o abrir” “contiene un rodenticida” “nombre del producto o número de autorización” “sustancia activa”; “en caso de accidente, llame al SERVICIO DE INFORMACION TOXICOLÓGICA (Teléfono: 91 562 04 20)”
- La porta cebos deben ser colocados en las inmediaciones de los lugares donde se ha observado actividad de roedores (zonas de paso, sitios de anidación, cebaderos, agujeros, madrigueras...)
- Cuando sea posible, el porta-cebos debe estar fijado al suelo o a otras estructuras.
- No abrir la bolsita que contiene el cebo.
- Colocar los porta-cebos fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas, animales de granja y otros animales a los que no va destinado el producto.
- No se debe aplicar en áreas donde los alimentos/piensos, bebidas, utensilios de cocina o las superficies de procesamiento de alimentos puedan entrar en contacto con el producto o bien ser contaminados por el mismo.
- No colocar los porta-cebos cerca de sistemas de drenaje de agua donde el cebo pueda entrar en contacto con el agua.
- Durante el uso del producto no comer, beber o fumar. Lavar las manos y áreas de piel expuestas después de utilizar el producto.
- Retirar el cebo sobrante y el porta-cebos al final del tratamiento.

**RECOMENDACIONES:**

Durante la preparación y el manejo del cebo deberían utilizarse guantes. Reponer los cebos consumidos o deteriorados diariamente, durante al menos 10-15 días consecutivos. Los emplazamientos deben mantenerse llenos de cebo, hasta que haya desaparecido la actividad de los roedores, que se observa porque el cebo permanece intacto. Controlados los roedores, es conveniente mantener una serie de emplazamientos para prevenir una inversión.

**RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE**

**La intoxicación puede producir:** La principal manifestación del envenenamiento con anticoagulantes es la diátesis hemorrágica.

**Primeros auxilios:** retire a la persona de la zona contaminada. Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos; no olvide retirar las lentillas. Lave la piel con abundante agua y jabón. No administrar nada por vía oral. En caso de ingestión reciente (< 3 h), y si la persona está consciente, provoque el vómito. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase. **NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.**

Consejos terapéuticos: En caso de ingestión, descontaminación digestiva, según el estado de conciencia.

Administre una solución acuosa de carbón activado y un catártico salino de sulfato sódico.

*Antídoto:* vitamina K1.

Controle el tiempo de protombina. Tratamiento sintomático.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL SERVICIO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel. 915 620420.**

**OBSERVACIONES**

**BRODICUM Pasta Fresca** es un **BIOCIDA DE USO DOMÉSTICO**, por lo que A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO que aparecen en la etiqueta del producto.