



ROE

ROE-GRANO 150 GR

- Rodenticida anticoagulante de segunda generación en grano rojo.
- Atrayente y práctico: monodosis suficientes para una aplicación doméstica.
- Contra rata parda o de alcantarilla, ratón común y demás roedores.
- Listo uso en portacebos.
- Efectivo en roedores jóvenes y adultos.



Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo

6 Bolsitas de 25 gr. Autorizado uso doméstico.

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.

COMPOSICIÓN:

Bromadiolona 0,0029%

DATOS LOGÍSTICOS

Descripción: ROE-GRANO 150 GR

Cod. Producto: 231532

Envase: 150 gr

Código EAN: 8424084008714

Unidad Caja: 24

Código DUN: 18424084008711

Cajas / Palet: 80 (1920 ud)

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ



Viladomat 321 - 08029 Barcelona



(34) 934 952 500



massoconsumo@cqmasso.com

www.massosconsumo.com

ROE-GRANO 150 GR

Modo de empleo:

Obligatorio su uso en portacebos resistentes a la manipulación y correctamente etiquetados (ref. 231319 Portacebos Ratones, 231318 Portacebos Ratons, 231650 Portacebos Túnel de Doble Acceso)



- **Uso en interiores** : interior de los edificios, aparcamientos cerrados e instalaciones fijas o móviles cuyos huecos al exterior se encuentran habitualmente cerrados.
- **Uso en exteriores** : alrededores de los edificios, a lo largo del perímetro exterior de las edificaciones o instalaciones sin superar una distancia máxima de 0,5 metros entre el portacebos y la edificación/instalación. También para estaciones abiertas de autobuses o trenes, o zonas de puerto.

Categoría de usuario: Público en general (usuario no profesional).

Dosis y frecuencia de aplicación:

- Ratones: 60 gr de cebo por portacebo.
- Ratons: 100 gramos de cebo por portacebo .

En ambos casos, si se necesita usar más de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 5-10m (5m en el caso de una infestación muy fuerte y 10m en una infestación débil).

Instrucciones de uso:

- Los portacebos deben revisarse al menos cada 2-3 días en caso de ratones y cada 5-7 días en caso de ratas al comienzo del tratamiento. Posteriormente, revisar como mínimo, una vez a la semana para comprobar la aceptación del cebo, que los portacebos están intactos y para retirar los roedores muertos. Recargar el portacebos cuando sea necesario.
- Se recomienda el uso de guantes. Alrededor de edificaciones (sólo ratas): colocar el portacebos en zonas no sujetas a inundación. Reemplazar los cebos que hayan sido dañados por el agua o contaminados por la suciedad.
- Colocar los portacebos fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas, animales de granja y otros animales a los que no va destinado el producto.
- Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.