



Jardín

ACEITE INSECTICIDA-ACARICIDA 500 ML

- Insecticida y acaricida a base de aceite mineral de origen natural.
- Actúa por contacto provocando la muerte por asfixia de huevos, larvas y adultos de **cochinillas, pulgones y ácaros.**
- **Preventivo y curativo.**
- Para cítricos, frutales de hueso y pepita.
- Producto utilizable en Agricultura Ecológica.
- Uso en **invierno** y en **verano**.



Modo de empleo:

Aceite de parafina 79% (p/v) [CE]

Pulverización foliar manual con mochila (concentrado a diluir)

Dosificación: desde 5 ml / L de agua (**contiene dosificador**)

Hasta 50 litros

Periodo de aplicación: todo el año

Producto utilizable en Agricultura Ecológica según el Reglamento (UE) 2018/848 y 2021/1165.

Control ECOCERT SA F-32600

DATOS LOGÍSTICOS

Descripción:	ACEITE INSECTICIDA ACARICIDA MASSO JED		
Cod. Producto:	231559	Envase:	500 ml
Código EAN:	842408409100	Unidad Caja:	12
Código DUN:	28424084009104	Uds/ Palet:	360 ud (30 cajas)
-		-	

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ



Viladomat 321 - 08029 Barcelona



[34] 934 952 500



massoconsumo@cqmasso.com

www.massosconsumo.com

Aplicaciones autorizadas, dosis y modo de empleo: Aplicar mediante pulverización normal entre 1 y 4 aplicaciones máximo por campaña con un intervalo mínimo entre ellas de 15 días.

Rociar abundantemente el tronco y todas las ramas para garantizar la eficacia del producto.

CULTIVO	AGENTE	DOSIS (ml de producto/L)	DOSIS (ml de producto/m ²)	Volumen L caldo (L/100 m ²)	ÉPOCA DE APLICACIÓN
CÍTRICOS (Naranja, Mandarin (incluido clementino e híbridos), Toronja, Pomelo, Limonero, Lima)	Trips ^{***} , Espumadora ^{**} (<i>Philaenus spumarius</i>), Psila africana ^{**} (<i>Trioza erythrae</i>), Mosca de la fruta ^{**} (<i>Ceratitis capitata</i>), Mosca blanca (<i>Aleyrodidae</i>), Cochinillas (<i>Coccidae</i>), Ácaros, Cochinillas harinosas (<i>Pseudococcidae</i>), Piojos (<i>Diaspididae</i>)	5-40	1-4	10-20	Verano ^{**}
	Áfidos, pulgones (<i>Aphididae</i>)	6,66-22,5	1-2,25	10-15	Invierno ^{***}
FRUTALES DE HUESO (Melocotonero (incluido Nectarino, Paraguayo, y otras variedades e híbridos), Albaricoquero, Ciruelo, Cerezo, Endrino)	Ácaros, Espumadora ^{**} (<i>Philaenus spumarius</i>), Mosca del vinagre de alas manchadas ^{**} (<i>Drosophila suzukii</i>)	5-20	1-2	10-20	Verano ^{**}
	Cochinillas (<i>Coccidae</i>) Áfidos, pulgones (<i>Aphididae</i>) Cochinillas harinosas (<i>Pseudococcidae</i>) Piojos (<i>Diaspididae</i>)	5-30	1-3	10-20	Invierno ^{***}
	Ácaros	6,66-30	1-3	10-15	Invierno ^{***}
FRUTALES DE PEPITA (Manzano, Peral (incluido Nashi y Pera blanca china), Nispero y Nispero del Japón, Membrillero.)	Ácaros, Áfidos, pulgones (<i>Aphididae</i>), Espumadora ^{**} (<i>Philaenus spumarius</i>) Psila del peral ^{**} (<i>Cacopsylla pyri</i>)	5-20	1-2	10-20	Verano ^{**}
	Cochinillas (<i>Coccidae</i>) Cochinillas harinosas (<i>Pseudococcidae</i>) Piojos (<i>Diaspididae</i>)	5-30	1-3	10-20	Invierno ^{***}
	Ácaros	6,66-30	1-3	10-15	Invierno ^{***}

• **PREPARACIÓN DEL CALDO:** Verter la cantidad necesaria de producto en el equipo de pulverización llenado de agua hasta la mitad, agitar y completar con el resto de volumen de agua necesario. Aplicar la mezcla inmediatamente después de su preparación. Aplicar homogéneamente sobre las zonas a tratar mediante pulverización normal.

• **CONDICIONES DE USO:** Aplicar antes del cambio de color de los frutos. No aplicar antes de 40 días de haber aplicado azufre. No aplicar durante la floración. No aplicar fuera del intervalo 5°C-35°C. En condiciones de deficiencia hídrica, regar antes del tratamiento. No aplicar en días calurosos y secos.

(*) Uso secundario.

(**) Aplicación en verano: Aplicar desde BBCH 69 (fin de la floración: han caído todos los pétalos) hasta BBCH 85 (maduración avanzada).

(***) Aplicación en invierno: Aplicar desde BBCH 00 (reposo: yemas vegetativas y de inflorescencias indiferenciadas, cerradas y cubiertas de escamas) hasta BBCH 69 (fin de la floración: han caído todos los pétalos).

PLAZO DE SEGURIDAD (días que deben transcurrir entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos destinados a consumo humano, ganadero o entrada de ganado): No procede fijarlo.

Periodo de aplicación

Todo el año. Evitar las temperaturas extremas y las horas de máxima radiación solar.

TRATAMIENTO DE INVIERNO (en periodo de reposo): **DE NOVIEMBRE A FEBRERO**

E F M A M J J A S O N D

